

INSTRUÇÃO DE USO

OPTIVE OMEGA™ 3 UD

carmelose sódica
trelose di-hidratada
glicerol, levocarnitina e eritritol

Sem conservantes

Emulsão oftálmica

Lubrificante ocular

USO ADULTO

APRESENTAÇÃO

Optive Omega™ 3 UD é acondicionado em envelopes de alumínio dentro de caixa contendo 30 flaconetes plásticos com 0,4 ml de emulsão oftálmica estéril para administração por via oftálmica.

COMPOSIÇÃO

Optive Omega™ 3 UD contém: carmelose sódica, glicerol, polissorbato 80, butil-hidroxitolueno, trelose di-hidratada, Pemulen TR-2, eritritol, levocarnitina, óleo de rícino, óleo de linhaça, estearato de polioxil 40, ácido bórico, hidróxido de sódio/ ácido clorídrico se necessário para ajuste de pH e água purificada.

INDICAÇÕES

Optive Omega™ 3 UD é indicado para lubrificar a superfície dos olhos e ajudar a fornecer alívio temporário do ressecamento, irritação, queimação, desconforto e/ou quaisquer outros sintomas causados pela doença do olho seco ou fatores ambientais.

CONTRAINDICAÇÕES

Optive Omega™ 3 UD é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer ingrediente deste produto.

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram identificadas durante estudos clínicos e a pós-comercialização do **Optive Omega™ 3 UD** na prática clínica: hiperemia conjuntival, vermelhidão ocular, secreção ocular e prurido ocular.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não ingerir a emulsão. Somente para uso único. Para evitar contaminação ou possível lesão ocular, não toque a ponta do flaconete em nenhuma superfície e evite o contato direto com o olho. Não use se o flaconete estiver danificado. Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso no flaconete e na embalagem externa. Não utilize o produto se a emulsão mudar de cor. Este produto não se destina a ser reutilizado e deve ser descartado imediatamente após o uso inicial. Este produto não contém conservantes e deve ser usado imediatamente após aberto para evitar contaminação que pode resultar em infecções oculares. Interrompa o uso do produto e consulte um médico se sentir dor nos olhos, alterações na visão, vermelhidão contínua ou irritação dos olhos, ou se a condição piorar. Pode causar turvação transitória da visão que pode prejudicar a capacidade de dirigir ou utilizar máquinas. O paciente deve esperar até que sua visão esteja normalizada antes de dirigir ou usar máquinas. O produto pode ser usado antes de colocar ou depois de retirar as lentes de contato.

O boro tem sido associado a efeitos reprodutivos adversos em animais em doses elevadas. O produto contém 0,6% p/p de ácido bórico com exposição total ao boro do ácido bórico inferior a 1 mg de boro/dia, o que é inferior à exposição diária permitida para adultos e crianças e significativamente inferior aos níveis que resultam em efeitos adversos em animais.

Consulte o seu médico em relação ao uso do produto se estiver grávida ou amamentando Gravidez: Não existem dados de estudos específicos sobre o uso de **Optive Omega™ 3 UD** durante a gravidez e lactação em humanos; no entanto, estudos em animais com carmelose sódica não demonstraram quaisquer efeitos prejudiciais na gravidez. Estudos em animais utilizando glicerol não mostraram evidências de teratogenicidade.

Lactação: **Optive Omega™ 3 UD** também não foi estudado em mulheres que amamentam; no entanto, não se espera uma absorção sistêmica significativa; portanto, não se prevê que seria excretado no leite materno.

Uso pediátrico: segurança e eficácia não foram demonstrados com **Optive Omega™ 3 UD** em pacientes pediátricos.

Uso geriátrico: Nenhuma diferença geral de segurança ou eficácia foi observada entre pacientes idosos e outros adultos.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas conhecidas.

Manter fora do alcance de crianças.

Produto de uso único. Conservar o produto em temperatura ambiente não acima de 30 °C.

MODO DE USO

Para abrir, gire e puxe a aba para removê-la. Instile 1 ou 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) conforme necessário e descarte o flaconete. Aguardar pelo menos 5 minutos entre a administração de **Optive Omega™ 3 UD** e outros produtos oftálmicos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Optive Omega™ 3 UD não requer condições especiais de armazenamento. **Optive Omega™ 3 UD** deve ser conservado em temperatura ambiente não acima de 30 °C.

A data de validade de 24 meses está impressa na embalagem externa e não deve ser usada após a data de validade. O flaconete é para uso único e deve ser descartado imediatamente após o uso inicial.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Registro ANVISA nº: 82664440022

Fabricante: Allergan Sales, LLC.2525 Dupont Drive, Irvine, Califórnia 92612, Estados Unidos da América

Detentor do Registro: AbbVie Farmacêutica Ltda

Av. Guido Caloi, 1935, 1º andar – bloco C – Jardim São Luis, São Paulo – SP

Origem do produto: Estados Unidos da América

©2026 AbbVie. Todos os direitos reservados.

Optive e seu design são marcas registradas da Allergan, Inc., uma empresa da AbbVie .

abbvie



AbbVie Line
Central de Relacionamento
0800 022 2843
www.abbvie.com.br

IU01.1